

Das Delir

Ausnahmezustand auch ohne Sucht

smart-Q Kongresse

Delir

ICD-10 Klassifikation

Ätiologisch unspezifisches HOPS

smart-Q Kongresse
mit Störung von

**Bewusstsein, Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis,
Psychomotorik, Emotionalität und
Schlaf-Wachrhythmus**

Hypoaktiv-hyperaktiv

Ursachen

Hirneigene Prozesse

- Tumore (z.B. Gliome, Metastasen, Meningeosis)
- Gefäßprozesse (Amyloidangiopathien, Schlaganfälle)
- Pontine/extrapontine Myelinolyse
- PRES (prolongiertes rev. Encephalopathiesyndrom)
- Neurodegenerative Erkrankungen
- Encephalitis

Ursachen

Systemische Störungen

- Exsickose
- Endokrinologisch/metabolische Entgleisung
- Anämie
- Sepsis (Prodromalzeichen)
- Substanzwirkung (toxisch/Entzug)
- Vitamin Mangel

Zustandsanalyse

1. **Bewusstsein**
2. **Gedankengang / Situationserfassung**
3. **Antrieb**
4. **Stimmung / affektive Modulation**
5. **Grundeinstellung**

**Angst /
reaktive Verstimmung**



**Hirnorganische
Störung**

(seelische Grundproblematik)

Symptomkontrolle

Angst, Unruhe, Erregung, Verwirrung



Benzodiazepine, neuroleptische Sedativa

Halluzinationen, Wahnentwicklung



Neuroleptika

Vegetative Dysregulation



Clonidin

Psychopharmaka

Praktische Anwendung

Haloperidol 3 x 0,5 mg  3 x 2 (5) mg
akut 5 mg i.v. Warnhinweis!!!

Quetiapin 2 x 12,5 mg  2 x 50 mg

Melperon 3 x 5 mg  3 x 50 mg

Lorazepam 3 x 0,5 mg  3 x 2,5 mg
2 mg i.v. (bis 16 mg)

Diazepam 3 x 2 mg  6 x 10 mg
oral / i.v.

Dämmerzustände

Levetiracetam: 2x500 bis 2x2000 mg

Nierenfunktionsanpassung

smart-Q Kongresse

Lacosamid: 2 x 200 mg

Lorazepam: 3x2 mg

Entzugsdelir

Vegetative Entgleisungen

- **Clonidin oral / i.v. bis 600 m μ g/die**
smart-Q Kongresse

Unruhe

- **Clomethiazol 2 Kps. /2-4 Stunden**
(Pause, wenn der Patient schläft)

Begegnung

1. Ursachenforschung

2. Symptomdeeskalation

3. Aufmerksamkeitsfokussierung